

治疗后的注意事项

药品清单及注意事项

※处方可能会因为治疗内容或者个人体质不同而有所不同。

- <止痛药(橘红色)> 内有4粒(2粒/次)
※只在疼痛时服用。避免空腹服用，一次2粒
再次服用请间隔3个小时以上
- <止痛栓剂> 内有2锭(1锭/次)插入肛门使用
※吃了止痛药后还是感到疼痛的时候使用
※再次使用请间隔3个小时以上
※请放入冰箱冷藏保管
- <消炎药(粉色)> 内含《21锭(7天份)·15锭(5天份)》
※抗生素(防止化脓)。1天3次 朝 中 晚 の 饭后服用
※没有吃饭也必须一天服用三次(早 中 晚)
※从治疗开始后的服药期间请不要饮酒

- 1、今天请于(晚饭后·睡前)服用。 2、明天早饭后开始服用。
※因体质原因，服用后如果有发热，起疹的症状请停止服用

消毒方法及注意事项

<消毒套装> 内含 消毒液1瓶·软膏1瓶·绷带(1星期份)

- ① <消毒液>用于患处消毒
※消毒前请务必洗手(脏手会导致病菌感染)
※如果不够用，可自行到药店购买Makiron(消毒液)
- ② <软膏> 涂完消毒液后，挤大约1厘米左右剂量涂于患处。
- ③ <绷带> 消毒和涂完软膏后，用新的绷带重新包扎(约30厘米)
※如果绷带与患处粘住，
用力撕扯可能会导致出血，
请将消毒液倒于绷带上慢慢撕开

消毒期间：治疗翌日开始每天一次，持续7天。

- ※请务必遵守消毒时间
(不按期消毒可能会延迟痊愈时间)

泡澡或淋浴

- <淋浴> 手术之后第4天开始患处可以碰水
※淋浴后请务必消毒
※淋浴后请务必用吹风机冷风吹干
※患处不可涂抹肥皂或沐浴露，只可清水冲洗。
- <泡澡> 手术之后第8天开始可以浴盆泡澡。
※消毒期间终了次日开始可以泡澡。
※泡澡日开始以后就可使用肥皂或沐浴露，如有出血情况，请止血以后再使用
※请小心清洗患处
※患处拆线之前请不要泡温泉，游泳池，海水浴

其他注意事项

- <性生活·自慰> 患处完全拆线后可行房或自慰
※拆线日因人而异，因体质原因可能需要一个月以上。
- <运动> 一周之内严禁剧烈运动，拆线之前也请尽量避免剧烈运动
- <龟头敏感> 包皮切除后，龟头与内裤摩擦可能会引起不适感，
大概数日时间即可适应，如实在无法忍受，
请尝试改穿三角裤，三角裤能避免阴茎位置移动，减少摩擦带来的不适感。
- <手术后> 手术日开始的一段时间可能会引起浮肿，淤青，出血
请不要担心，肯定可以痊愈。
※如果对于患处出血比较在意，请用绷带按住出血处大概10分钟时间即可止血。
如绷带按压止血法没有效果，可以到药店购买吸水棉花，
切一厘米左右微用力包扎出血处，隔天再取下，期间请避免重复揭开

※术后10天之后可能会因为患处的肿胀或纱布的原因导致排尿喷洒，
因为恢复需要时间，请不要担心。
- <包皮切除与增大治疗同时进行后，如果希望继续增大>
※增大治疗后，六个月以内的再度增大受厂家禁止。
- <术后咨询> 如有以上的注意事项以外的问题需要咨询
请联系下面的术后专用咨询热线
※通过网络邮件咨询有可能无法回复，
请务必电话咨询。
※关于治疗内容的咨询时间为 早上10点到下午7点