

治療後の注意事項

薬品清单 及 注意事項

- ※ 処方可能会因为治疗内容或者个人体质不同而有所不同。
- <止痛药(橘红色)> 内有4粒(2粒/次)
※ 只在疼痛时服用。避免空腹服用，一次2粒
再次服用请间隔3个小时以上
 - <止痛栓剂> 内有2錠(1錠/次) 插入肛门使用
※ 吃了止痛药后还是感到疼痛的时候使用
※ 再次使用请间隔3个小时以上
※ 请放入冰箱冷藏保管
 - <消炎药(粉色)> 内含《21錠(7天份)・15錠(5天份)》
※ 抗生素(防止化脓)。1天3次 朝 中 晚 の饭后服用
※ 没有吃饭也必须一天服用三次(早 中 晚)
※ 从治疗开始后的服药期间请不要饮酒
- 1、今天请于(晚饭后・睡前)服用。 2、明天早饭后开始服用。
※ 因体质原因，服用后如果有发热，起疹的症状请停止服用

消毒方法及 注意事項

- <消毒套装> 内含 消毒液1瓶・软膏1瓶・绷带(1星期份)
- ① <消毒液> 用于患处消毒
※ 消毒前请务必洗手(脏手会导致病菌感染)
※ 如果不够用，可自行到药店购买Makiron(消毒液)
 - ② <软膏> 涂完消毒液后，挤大约1厘米左右剂量涂于患处。
 - ③ <绷带> 消毒和涂完软膏后，用新的绷带重新包扎(约30厘米)
※ 如果绷带与患处粘住，
用力撕扯可能会导致出血，
请将消毒液倒于绷带上慢慢撕开

消毒期間: 治疗翌日开始每天一次，持续7天。

- ※ 请务必遵守消毒时间
(不按期消毒可能会延迟痊愈时间)

泡澡 或 淋浴

- <淋浴> 手术之后第 4 天开始患处可以碰水
※ 淋浴后请务必消毒
※ 淋浴后请务必用吹风机冷风吹干
※ 患处不可涂抹肥皂或沐浴露，只可清水冲洗。
- <泡澡> 手术之后第 8 天开始可以浴盆泡澡。
※ 消毒期间終了次日开始可以泡澡。
※ 泡澡日开始以后就可使用肥皂或沐浴露，如有出血情况，请止血以后再使用
※ 请小心清洗患处
※ 患处拆线之前请不要泡温泉，游泳池，海水浴

其他注意事項

- <性生活・自慰> 患处完全拆线后可行房或自慰
※ 拆线日因人而异，因体质原因可能需要一个月以上。
- <运动> 一周之内严禁剧烈运动，拆线之前也请尽量避免剧烈运动
- <龟头敏感> 包皮切除后，龟头与内裤摩擦可能会引起不适感，
大概数日时间即可适应，如实在无法忍受，
请尝试改穿三角裤，三角裤能避免阴茎位置移动，减少摩擦带来的不适感。
- <手术后> 手术日开始的一段时间可能会引起浮肿，淤青，出血
请不要担心，肯定可以痊愈。
※ 如果对于患处出血比较在意，请用绷带按住出血处大概10分钟时间即可止血。
如绷带按压止血法没有效果，可以到药店购买吸水棉花，
切一厘米左右微用力包扎出血处，隔天再取下，期间请避免重复揭开

※ 术后10天之后可能会因为患处的肿胀或纱布的原因导致排尿喷洒，
因为恢复需要时间，请不要担心。
- <包皮切除与增大治疗同时进行后，如果希望继续增大>
※ 增大治疗后，六个月以内的再度增大受厂家禁止。
- <术后咨询> 如有以上的注意事項以外的问题需要咨询
请联系下面的术后专用咨询热线
※ 通过网络邮件咨询有可能无法回复，
请务必电话咨询。
※ 关于治疗内容的咨询时间为 早上10点到下午7点